

Directrices sobre los medicamentos

¡IMPORTANTE! Revise cuidadosamente esta lista de medicamentos y consulte con el médico que escribió sus recetas antes de suspender cualquier anticoagulante o medicamento para la diabetes. Si está tomando anticoagulantes, siga las recomendaciones del médico que se los recetó. NO prepare ni duplique ningún medicamento olvidado después del procedimiento.

	NÚMERO DE DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO						
	10	5	4	3	2	1	Día de
Anticoagulante							
Ticlid® (ticlopidina)	NO TOMAR						
Warfarina® (coumadin) Effient® (prasugrel) Plavix® (clopidogrel)		NO TOMAR					
Brilinta®			NO TOMAR				
Aggrenox®, Arixtra® (fondaparinux) Eliquis® (apixaban), Persantine® (dipiridamol), Pletal® (cilostazol) Savaysa® (edoxabán), Xarelto® (rivaroxabán)					NO TOMAR		
Vitaminas y suplementos							
Aceite de pescado, hierro, multivitamínicos, hierba de San Juan, vitamina E, todos los demás suplementos			NO TOMAR				
Pérdida de peso (consulte más información en "Diabetic & Weight Loss Medications" [Medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso])							
Fentermina/fendimetrazina (todas las marcas)			NO TOMAR				
Analgésicos							
Aspirina (ASA) 81 mg Tylenol® (acetaminofeno)	Continúe tomando Nada por vía oral 4 horas antes de la hora de llegada a la cita.						
Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (Advil, Aleve, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y meloxicam)	Continúe tomando Nada por vía oral 4 horas antes de la hora de llegada a la cita.						

	DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO	DÍA DEL PROCEDIMIENTO
Presión arterial, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) y antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA)		
Accupril® (quinapril), Aceon® (perindopril), Altace® (ramipril), Avapro® (irbesartán), Benicar® (olmesartán), Captopril®, Cozaar® (losartán), Diovan® (valsartán), Edarbi® (azilsartán), Eprosartan®, Fosinopril®, Lotensin® (benzapril), Mavik® (trandolapril), Micardis® (telmisartán), Moexipril®, Prinivil® (lisinopril), Vasotec® (enalapril), Zestril® (lisinopril)	Tomar como de costumbre	NO TOMAR
Presión arterial y diuréticos		
Bumex® (bumetanida), clortalidona, Demadex® (torsemida), Diuril® (clorotiazida), Edecrin®	Tomar como de costumbre	NO TOMAR

(ácido etacrínico), Indapamida®, Lasix® (furosemida), Microzide®(hidroclorotiazida), Metolazona		
Presión arterial: betabloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio		
Adalat® o Procardia® (nifedipina), Bystolic® (nebivolol), Calan® (verapamil), Cardene® (nicardipina), Cardizem LA® o Tiazac® (diltiazem), Corgard® (nadolol), Covera-HR® o Verelan PM® (verapamil), Dynacirc® (isradipina), Inderal LA® o Innopran XL® (propranolol), Lopressor® o Toprol XL® (metoprolol), Nimotop® (nimodipina), Norvasc® (amlodipina), Plendil® (felodipina), Sectral® (acebutolol), Sular® (nisoldipina), Tenormin® (atenolol), Zebata® (bisiprolol)	Tomar como de costumbre	Tomar como de costumbre

Directrices sobre los medicamentos

¡IMPORTANTE! Si es diabético, consulte con el médico que prescribió sus recetas antes de suspender cualquier medicamento para la diabetes.

	NÚMERO DE DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO		
	7	1	Día de
Medicamentos inyectables y orales para la diabetes o pérdida de peso (agonistas del péptido glucagonoide de tipo 1 [GLP-1])			
Adlyxin® (lixisenatida), Bydurean® (exenatida ER), Byetta® (exenatida), Mounjaro® (tirzepatida), Ozempic® o Rybelsus® o Wegovy® (semaglutida), Saxenda® (liraglutida), Symlin® (pramlintida), Tanzeum® (albiglutida), Trulicity® (dulaglutida), Victoza® (liraglutida)	Si es diabético, consulte con el proveedor que receta sus medicamentos antes de suspender cualquier medicamento para la diabetes. Los medicamentos GLP-1 que se toman semanalmente deben suspenderse 7 días antes del procedimiento.	Siga una dieta de líquidos claros 24 horas antes de la hora de llegada al procedimiento. NO CONSUMA NADA 4 horas antes de la hora de llegada al procedimiento.	NO TOMAR El GLP-1 que se toma a diario debe suspenderse el día del procedimiento DESPUÉS del procedimiento, si come, tome la dosis habitual si corresponde ese día

	NÚMERO DE DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO			
	4	3	2	DÍA DEL PROCEDIMIENTO
Medicamentos orales para la diabetes o insuficiencia cardíaca (inhibidores de SGLT2)				
Steglatro® (ertugliflozina)			NO TOMAR	NO TOMAR DESPUÉS del procedimiento, si come, tome la dosis habitual
Farxiga® (dapagliflozina), Invokana® (canagliflozina), Jardiance® (empagliflozina)			NO TOMAR	NO TOMAR DESPUÉS del procedimiento, si come, tome la dosis habitual

Los pacientes diabéticos deben controlar el nivel de azúcar en sangre 4 veces al día si se administran insulina.	1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO			DÍA DEL PROCEDIMIENTO		
	DOSIS DE LA MAÑANA	DOSIS DE LA NOCHE	DOSIS DE LA HORA DE DORMIR	DOSIS DE LA MAÑANA	DOSIS DE LA NOCHE	DOSIS DE LA HORA DE DORMIR
Insulina						
Lantus® (insulina glargina), Levemir® (insulina detemir), Novolin® (isófana), Soliqua® (lixisenatida), Tresiba® (insulina degludec), Xultophy® (liraglutida/insulina degludec)			Tome la mitad de la dosis habitual si la toma con normalidad a la hora de dormir	Tome la mitad de la dosis habitual después del procedimiento si la toma con normalidad por la mañana	Tome la dosis habitual después del procedimiento si come,	tome la dosis habitual
Apidra® (insulina glulisina), Humalog® (insulina lispro), Humulin® (insulina regular), Novolin® Mix 70/30, Novolog® (insulina aspart), Novolog® Mix 70/30, insulina premezclada: 75/25, insulina regular	Tome la mitad de la dosis fija habitual O cubra los carbohidratos con la rotación habitual de carbohidratos		Tome la mitad de la dosis fija habitual	NO TOMAR	Tome la dosis habitual después del procedimiento si come y controle el nivel de azúcar en sangre	Tome la dosis habitual a la hora de dormir si come y controle el nivel de azúcar en sangre
Plumas de insulina	Igual a la parte anterior					
Bombas de insulina	Continúe la administración de insulina sin cambios. Administre insulina adicional por carbohidrato u otro protocolo.					
Otros medicamentos para la diabetes						
Metformina y medicamentos combinados con metformina				NO TOMAR DOSIS DE LA MEDIANOCHE	NO TOMAR Reanude la dosis habitual el día después del procedimiento	
Medicamentos sin metformina Actos® (pioglitazona), Avandia® (rosiglitazona), Amaryl® (glimepirida), Avandaryl® (glimepirida/rosiglitazona), DiaBeta® (glyburida), Duetact® (pioglitazona/glimepirida), Glucotrol® (glipizida), Glyset® (miglitol), Januvia® (sitagliptina), Onglyza® (saxagliptina), Prandin® (repaglinida), Precose® (acarbose), Starlix® (nateglinida), Tradjenta® (linagliptina)				Tomar como de costumbre	NO TOMAR DESPUÉS del procedimiento, si come, tome la dosis habitual	